


POUR PRENDRE SOIN DE MA SANTÉ SEXUELLE,
JE CHOISIS LA CARTE...

8

BON À SAVOIR
D'AUTRES
CARTES
EXISTENT...



VIH / IST
Dépistages conseillés
tous les 3 mois.

Infos & questions sur
www.enipse.fr
ou Sida Info Service
0800 840 000
ou www.aides.org

 **Fiertés Pas-de-Calais**



Toutes les infos sur
www.fiertespdc.org

FIERTÉS
Pas-de-Calais

Association départementale du Pas-de-Calais, région Hauts-de-France de lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et de prévention santé.
Agréée complémentaire de l'enseignement public par le Rectorat de l'Académie de Lille.
Agréée au Droit des Usagers de la Santé, prévention santé sexuelle par l'Agence Régionale de la Santé.

TPE

Traitement Post-Exposition

BON A SAVOIR

Les services des urgences des hôpitaux vous accueillent 24/24 pour évaluer le risque. En journée, certains services spécialisés dans le VIH peuvent vous prendre en charge.

Téléphonez gratuitement à Sida Info Service au 0 800 840 800 pour avoir l'adresse du service des urgences le plus près de l'endroit où vous vous trouvez.

C'est quoi ?

Le T.P.E. est un traitement anti-rétroviral temporaire de 28 jours. Le but est de diminuer le risque d'infection par le VIH immédiatement après un risque d'exposition : *rapport non protégé, rupture de préservatif, éjaculation dans la bouche...*

Or si votre partenaire est séropositif-ve au VIH et que vous ne faites pas partie des publics à risque pouvant bénéficier de la PrEP, vous risquez vous-même d'être contaminé-e.

Pour que son efficacité soit la meilleure possible, il faut le débiter immédiatement et respecter attentivement les prescriptions du médecin.

Pour qui ?

Toutes les personnes séronégatives ou qui ne connaissent pas leur statut sérologique.

Où ?

Rendez-vous le plus vite possible aux urgences de tout hôpital (au mieux dans les 4 heures et au plus tard dans les 48 heures), de préférence avec votre partenaire sexuel.

Le médecin évaluera avec vous le risque pris et l'intérêt de vous prescrire un traitement post-exposition.

Ce traitement vise à éliminer le risque de contamination par le VIH.



Dans les
moins de
48h00



Initié aux
Urgences



28 jours de
traitement
antirétroviral

Test

Si la prise de risque date de plus de 48 heures, le TPE devient inefficace: faites-vous dépister.

L'infection peut être détectée dès le 15^e jour.

Si le résultat du test est négatif, ce n'est que 6 semaines après la prise de risque qu'un autre test par **prélèvement sanguin** permettra de savoir avec certitude que vous n'êtes pas atteint par le VIH (3 mois pour un Test Rapide d'Orientation Diagnostique - TROD).

Protection

Il est important d'utiliser systématiquement le préservatif, avec tous vos partenaires, jusqu'au prochain résultat des tests de dépistage.

Dialogue

Si vous aviez arrêté le préservatif avec votre partenaire régulier, il est important de discuter de votre prise de risque et de la nécessité de vous protéger à nouveau dans l'attente de votre test de dépistage.

Parlez-en avec :

- votre médecin ;
- le personnel médical dans les centres de dépistage ;
- nos bénévoles lors de nos permanences « Point Accueil Écoute Info » ou par mail : paei@artogalion.com

- nos partenaires :
www.enipse.fr,
www.sida-info-service.org
0 800 840 000,
www.aides.org